

## رموز الإنذار (بالألوان)

للاستجابة الفعالة لانتشار الفيروس، يمكن تحديد المناطق باللون المناسب (أخضر، أصفر، برتقالي أو أحمر) باستمرار للمساعدة على متابعة الوضع وزيادة جهود الاستجابة عند الحاجة، ورفع القيود عن منطقة معينة عند الإمكان. يجب أن تكون المناطق الفردية الصفراء والبرتقالية والحمراء محددة بإطار جغرافي ضيق قدر الإمكان (الأحياء، البلديات، المقاطعات، الولايات) بحيث يمكن إنشاء حدود ونقاط تفتيش وقيود على التنقل حيث تدعو الحاجة، حتى من وإلى مناطق من لون واحد.

## تصنيف المناطق

**المناطق الخضراء:** المناطق التي لا تحوي إصابات مؤكدة أو تحوي بضع إصابات مستوردة  
**المناطق الصفراء:** المناطق التي تحوي بضع إصابات جراء انتقال محلي للعدوى، ولكن دون إصابات جراء انتقال العدوى ضمن المجموعات  
**المناطق البرتقالية:** المناطق المحاذية للمناطق الحمراء أو التي تحوي تجمعات صغيرة  
**المناطق الحمراء:** المناطق التي تشهد انتقالاً للعدوى ضمن مجموعات

أحمر	برتقالي	أصفر	أخضر	بروتوكول الاستجابة
✓	✓	✓	✓	نشر التوعية العامة بما في ذلك طريقة انتقال العدوى وطريقة تفاديه (إبقاء مسافة خلال التواصل والتفاعل، غسل اليدين، وضع القناع)
✓	✓	✓	✓	وضع خطة استجابة سريعة للقيام بفحص السكان المحليين لمواضع محتملة إجراء فحوصات سريعة عند الحدود لأشخاص انتقلوا من مناطق صفراء أو برتقالية لتحديد أولئك الذين يعانون من العوارض (ارتفاع حرارة الجسم، القحة)
✓	✓	✓	✓	الإبقاء على الأشخاص الذين استعملوا نفس وسيلة النقل (طائرة، قطار، باص، سيارة) حتى ظهور نتائج الفحوصات. فإذا جاءت إيجابية، وضع الأشخاص المصابين في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، بالإضافة إلى الطاقم والركاب الآخرين (فردياً أو ضمن مجموعات صغيرة)
✓	✓	✓	✓	فرض حجر صحي لمدة 14 يوماً على أشخاص يشتبه أنهم كانوا على اتصال بأشخاص مصابين بما في ذلك أولئك الآتين من المناطق الحمراء لتحديد من هم الأشخاص الذين كانوا على اتصال بشخص أو أشخاص مصابين، وإجراء التحاليل اللازمة لهم مع مراقبتهم و/أو إلزامهم بالحجز الذاتي
✓	✓	✓	✓	التشجيع على الوقاية الذاتية (الإبقاء على مسافة معينة لدى التواصل، غسل اليدين، كيفية التصرف عند العطس)
✓	✓	✓	✓	المراقبة المستمرة للحالة الصحية لمجموعة معينة من الأشخاص على اتصال مستمر فيما بينهم وبالأخص في مناطق ظهور العدوى للحد من أي انتشار محتمل لها
✓	✓	✓	✓	حث المواطنين على تجنب التجمعات غير الضرورية وخاصة في الأماكن المغلقة
✓	✓	✓	✓	تأمين الحماية القصوى للطاقم الصحي
✓	✓	✓	✓	التشجيع على اتخاذ تدابير وقائية مثل ارتداء الأكتمة الواقية
✓	✓	✓	✓	تأجيل أو إلغاء التجمعات والفعاليات
✓	✓	✓	✓	تطهير الأماكن العامة
✓	✓	✓	✓	إجراء تحاليل متكررة للأشخاص المصابين
✓	✓	✓	✓	زيادة فعالية وسرعة التحاليل
✓	✓	✓	✓	إقفال المدارس وأماكن العبادة والأعمال
✓	✓	✓	✓	منع السفر إلا في الحالات الطارئة
✓	✓	✓	✓	إقفال أو فرض الحجر الصحي على الأماكن المصابة، مع إبقاء السكان في منازلهم وتوصيل حاجياتهم دون الاتصال المباشر معهم
✓	✓	✓	✓	وضع كل من كان له تواصل مع أشخاص مصابين في الحجر الصحي
✓	✓	✓	✓	حشد الموارد الوطنية (الطبية واللوجستية) للمنطقة المعزولة
✓	✓	✓	✓	عزل المرافق المخصصة للحالات المصابة عن الخدمات الصحية الأخرى
✓	✓	✓	✓	إنشاء أقسام مختلفة في المستشفيات للفصل بين الحالات وفقاً لخطورتها